


chemiczne w żywności. Należy zauważyć, że w przypadku leczenia nowotworów kluczowe znaczenie ma wczesna diagnostyka, także uwarunkowana odpowiednią edukacją rodziców.

Zachorowania na niedokrwistość

W 2012 roku odnotowano wzrost przypadków niedokrwistości wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia w powiecie żnińskim (gm. Łabiszyn), w 2008 r. było to 87,7 przypadków na 10 tys. osób, natomiast

w 2012 r. aż 151,2), golubsko-dobrzyńskim (gm. Kowalewo Pomorskie) – odpowiednio 40,8 i 60,1 oraz w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (48,7 i 80,8). Poprawa wskaźników miała miejsce w Toruniu i powiecie toruńskim oraz powiecie nakielskim (gm. Nakło nad Notecią, gm. Szubin). Średnie wskaźniki zapadalności dla BTOF w 2012 roku wyniosły 74,5 na 10 tys. osób i plasowały się poniżej średniej dla województwa (82).

Wykres 6 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono niedokrwistości, wg powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności w wieku 0-18)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)

Zapadalność na choroby tarczycy i cukrzycę