


Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)

W strukturze schorzeń dzieci i młodzieży do 18 roku życia mieszkających na obszarze BTOF dominują zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, otyłość, zniekształcenia kręgosłupa a także dychawica oskrzelowa.

Na obszarze BTOF wśród osób w wieku 0-18 najbardziej nasilonym problemem zdrowotnym są zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, jednak w badanym okresie sytuacja uległa poprawie o 27%. Drugim pod względem częstości schorzeniem identyfikowanym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest zniekształcenie kręgosłupa – także wykazujące trendy malejące. Bardzo poważnym zagrożeniem zdrowotnym dzieci na obszarze BTOF jest otyłość. Mimo, że od 2008 roku odsetek dzieci otyłych pozostaje niemal stabilny, wciąż jest bardzo wysoki i należy go wiązać z rosnącą zachorowalnością dzieci i młodzieży na cukrzycę (wzrost o 20% w stosunku do 2008 roku). Niepokojące są także dane o wzroście ilości dzieci i młodzieży leczonych z powodu dychawicy oskrzelowej (↑34%), niedokrwistości (↑30%) i nowotworów (↑23%). Szczególnie wysoki wzrost leczonych odnotowano w zakresie chorób tarczycy (↑45%). Nadal na wysokim poziomie pozostaje odsetek leczonych z powodu alergii pokarmowych i skórnych, jednak szczególnie w przypadku alergii pokarmowych odnotowano w stosunku do 2008 roku istotny spadek (20%).

Wykres 15 Zapadalność na poszczególne jednostki chorobowe u dzieci i młodzieży do lat 18 na obszarze BTOF w roku 2008 i 2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)