

**Wykres 22 Dorośli, u których stwierdzono choroby układu krążenia, według powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)

### Zapadalność na przewlekły nieżyt oskrzeli oraz dychawicę oskrzelową

Zapadalność na przewlekły nieżyt oskrzeli oraz dychawicę oskrzelową wykazuje tendencje wzrostowe zarówno w województwie jak i na obszarze BTOF. Odwrotnym trendem cechuje się powiat golubsko-dobrzyński (gm. Kowalewo Pomorskie). Liczba zachorowań spadła na przestrzeni 4 lat z 449,5 przypadków na 10 tys. ludności w 2008 r. do 337,8 przypadków w 2012 r. Wskaźnik zapadalności dla BTOF w 2012 roku wyniósł 278,7 na 10 tys. osób i przekroczył średnią dla województwa (259,9).

**Wykres 23 Dorośli, u których stwierdzono przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawicę oskrzelową, według powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności)**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)