


Zapadalność na przewlekłą chorobę układu trawiennego

Najwyższe wskaźniki zapadalności na przewlekłą chorobę układu trawiennego odnotowuje się w powiecie żnińskim (gm. Łabiszyn) - 2008 - 428,5; 2012 - 958,9 oraz w Toruniu i powiecie toruńskim (2008 - 414,3; 2012 - 655,8). Wskaźniki te plasują się znacznie powyżej średniej dla województwa (2012 - 428,3). Najniższy odsetek zachorowań na przewlekłą chorobę układu trawiennego odnotowano

w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (2008 – 173,3; 2012 – 348,6 na 10 tys.). Wskaźnik zapadalności dla BTOF w roku 2012 wyniósł 492 na 10 tys. osób i przekroczył średnią dla województwa (428,3).

Wykres 24 Dorośli, u których stwierdzono choroby układu trawiennego, według powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)

Zapadalność na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej

W zakresie chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej najwyższe wskaźniki wykazuje Toruń i powiat toruński. W ostatnich latach zanotowano wzrost zachorowań na powyższe choroby. Podobnie wysokie wskaźniki zanotował powiat żniński (2012 r. - 1042,7 przypadków zachorowań na 10 tys. ludności), na terenie którego leży gm. Łabiszyn wchodząca w skład BTOF. Natomiast najniższe wskaźniki zapadalności na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej odnotowano w powiecie golubsko-dobrzyńskim (gm. Kowalewo Pomorskie) – 404,1 przypadków zachorowań/10 tys. ludności w 2012 r. Wskaźnik zapadalności dla BTOF w 2012 roku wyniósł 714,7 na 10 tys. osób i nieznacznie przekroczył średnią dla województwa (713,4).